

VERTISSEMENTS AGRICOLES téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

BIBLN
03201 03003 00097 3147C 27/05/93-15h U
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
REGIE DEPOT LEGAL
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
58, RUE RICHELIEU

75000 PARIS

Bulletin n° 241 (14/93) du 27 Mai 1993

MAIS : Traitement sésamie début Juin

POIS

PUCERONS

Situation

Peu voire pas d'évolution des populations depuis début Mai. Le temps actuel reste défavorable.

Préconisation

Aucune intervention n'est justifiée, sauf situation particulière (50 pucerons par plante pleine floraison, plus de 100 pucerons par plante fin floraison).

MALADIES

Situation

Anthraxose toujours peu observée. Temps actuel favorable au botrytis.

Préconisation

Parcelles non encore protégées et qui arrivent en pleine floraison: traitement anti-botrytis nécessaire.

Parcelles traitées avant le 10 Mai et qui sont toujours en fleurs: un renouvellement de la protection peut-être envisagée.

Dans les deux cas, utiliser un produit mixte si vous observez des symptômes d'anthraxose sur les feuilles basses (très peu de parcelles concernées).

Mildiou

Grosse attaque de mildiou constatée sur la région. Une lutte efficace ne peut-être envisagée que par le biais de traitements de semences avec des produits spécifiques.

Les traitements de rattrapage en végétation ne peuvent se faire qu'avec du PULSAN et ont souvent une efficacité aléatoire.

MAÏS

SESAMIE

Situation

Le vol est en cours. Les captures sont actuellement suivies sur 38 pièges avec la collaboration de divers Organismes. La situation est la suivante :

- 2 pièges ont commencé à capturer avant le 10/05 ;
 - 5 entre le 10 et le 15/05 ;
 - 7 entre le 16 et le 21/05 ;
 - 9 depuis le 22/05 ;
 - 15 pièges n'ont pas encore fait de captures.
- Les toutes premières éclosions devraient avoir lieu vers le 1er Juin.

Préconisation

Quand traiter ?

Selon les zones définies dans le précédent bulletin :

* Sur les cultures les plus précoces, actuellement au stade 6-7 feuilles : INTERVENTION UNIQUE à pleine dose à partir du 4-5 Juin.

* Sur les cultures plus tardives (levée à 2-3 feuilles), prévoir une double application à demi-dose :

- 1ère application du 1er au 5 Juin ;
- 2ème application : 10 à 15 jours plus tard.

TOURNESOL

PUCERONS

Situation

Fin de vol. Seuil de 50 pucerons par plante dépassé localement sur tournesols précoces.

Préconisation

Intervenir si le seuil est dépassé lors de l'observation en parcelles.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693